

第2類医薬品

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

救風鼻炎カプセル(鼻炎用内服薬)

鼻炎は、大きく二つに分けることができます。一つは鼻かぜと言われる「急性鼻炎」、もう一つは花粉、ほこり、カビ、ダニ、動物の毛が原因となっておこる「アレルギー性鼻炎」です。

救風鼻炎カプセルは、抗ヒスタミン剤のクロルフェニラミンマレイン酸塩をはじめ、鼻粘膜の充血、はれをしずめる塩酸ブソイドエフェドリン、抗炎症剤のグリチルリチン酸モノアンモニウムなどを配合したカプセルタイプの鼻炎薬です。くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなど鼻炎による不快な症状に効果をあらわします。カプセルは小型のホワイトカプセルで服用しやすく、服用量を調整することにより小児(7才以上)から服用できるようになっています。

特長

- 抗炎症剤のグリチルリチン酸モノアンモニウム配合
- 小児(7才以上)から服用可能
- 血管収縮作用のある交感神経興奮剤の塩酸ブソイドエフェドリン配合
- 小型のホワイトカプセルで服用しやすい



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)次の症状のある人。 前立腺肥大による排尿困難
- (3)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気などがあらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬などにより、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難、むくみ
- (8)次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- (9)モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩など)で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、けいれん
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

□のかわき、眠気

4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量

食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりしますと食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分・分量 1日量(6カプセル)中

成 分	分 量	は た ら き
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目をおさえます。
塩酸プソイドエフェドリン	180mg	鼻粘膜の充血やはれをはずめて、鼻づまりを緩和します。
グリチルリチン酸モノアンモニウム	55mg	抗炎症作用により、鼻みず、鼻づまりをおさえます。
無水カフェイン	120mg	鼻づまりからくる頭重感をやわらげます。

添加物：乳糖、硬化油、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度
0120-149-931

製造販売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

SKSD605