

第2類医薬品 (外用鎮痛消炎薬)

# ノリツIDハUSS

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 次 の 部 位 に は 使 用 し な い で く だ さ い  
(1) 目の周囲、粘膜など。  
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。  
(3) みずむし、たむしなどまたは化膿している患部。  
3. 長期連用しないでください

**🗨 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

使用期限

製造番号

使用に際しては、この説明文を必ずお読みください。  
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

品目番号 富山 追77-74-626

**成分・分量** 膏体100g中

インドメタシン……………0.375g  
 添加物：D-ソルビール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル、トメントール、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、エタノール、モノオレイン酸ソルビタ、黄色205号、青色1号

**効能・効果**

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

**用法・用量**

膏面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 1才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 11才未満の小児に使用させないでください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 連続して2週間以上使用しないでください。
- (6) 粘着テープなどでかぶれやすい人は使用しないでください。
- (7) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (8) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。
- (9) 貼付後、はがす際まれに粘着シートと膏体部分が分離する場合がありますが、効果に影響はありません。

**保管および取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は袋のチャックをしっかり閉めて保管してください。
- (5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。

**発売元**

常盤薬品工業株式会社  
 大阪市中央区安土町3-5-12  
 NOEVIR GROUP

お問い合わせは  
 常盤薬品工業株式会社  
 お客様相談室0120-875-710まで  
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)  
[www.kusuribako.jp](http://www.kusuribako.jp)

副作用被害救済制度  
 0120-149-931

**製造 大協薬品工業株式会社**  
 販売元 富山市水橋倉等173

8枚入(11.8cm×7.5cm)  
 1,200円(税別)

128500  
 TKYL501

